



Žltáčka typu "A"

Je akútny infekčný zápal pečene spôsobený vírusom, ktorý sa do tela najčastejšie dostane v potrave alebo nápojoch.

Prenos ochorenia

- kontakt s infikovanou osobou,
- neumytými rukami po použití toalety,
- zdieľaním osobných predmetov,
- pitím tekutín a jedením potravín, na ktoré sa dostal vírus žltáčky typu A.



Príznaky

- prvé príznaky sú podobné chrípke (únava, zvýšená teplota, bolesti svalov),
- po niekoľkých dňoch zažívacie ťažkosti (bolesti brucha, nechúť k jedlu, vracanie),
- neskôr tmavý moč, svetlá stolica alebo hnačka,
- žlté sfarbenie kože a očných bielkov.

Inkubačná doba

- doba od nákazy po prejav ochorenia je 15-50 dní.



PREVENCIA


Dôsledné umývanie rúk po použití toalety, pred jedlom či fajčením

Dezinfekcia

Pitie pitnej vody jedine z overeného zdroja



OČKOVANIE



Očkovanie sa odporúča osobám vo zvýšenom riziku nákazy, osobám cestujúcim do krajín s nízkou sociálno-ekonomickou a hygienickou úrovňou, deťom vo veku dvoch rokov žijúcim v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom a nariaďuje sa osobám v priamom kontakte s chorým.